



Blé - Pucerons : Traitements inutiles.

Maïs - Pyrale : Traitements entre 6 et 10 juillet.

Pucerons sur blé

Les blés sont entre le stade grain laiteux et pâteux.

Les colonies de pucerons sont rares sur les épis.

Toute intervention est inutile.

Les blés ne sont plus sensibles à ce parasite à partir du stade grain pâteux.

Pyrale du maïs

Les premiers papillons adultes sont apparus dans notre cage d'élevage le 22 juin.

Avec l'élévation des températures, le vol s'intensifie. Il devrait atteindre son maximum entre les 6 et 10 juillet, selon les secteurs.

Les **traitements chimiques** devront avoir lieu à partir du début de la semaine prochaine dans les secteurs les plus précoces :

- **6 juillet** : secteurs de Lunéville, Sarrebourg, Château-Salins, Pont-à-Mousson, zones de vallées.

- **7 juillet** : secteur de Toul.

- **8 juillet** : secteurs de Mirecourt, Vittel, Neufchâteau.

- **9 juillet** : région de la Woëvre.

- **10 juillet** : secteurs de plateaux (Barrois, Haye), Longuyon, sud-ouest vosgien.

Pour les produits, se reporter au dépliant SPV - AGPM figurant dans le classeur vert.

Si vous avez opté pour la **lutte biologique**, le deuxième lâcher de trichogrammes devra être effectué vers le 4 - 5 juillet.

P401

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

